

- cambios en el color del pelo
- pérdida inusual del cabello o fragilidad
- pérdida de pigmentación de la piel
- erupción cutánea, posiblemente con descamación de la piel
- enrojecimiento e inflamación en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
- aumento de las enzimas hepáticas
- descenso de la albúmina en sangre
- proteínas en la orina
- descenso del número de plaquetas (células sanguíneas que intervienen en la coagulación de la sangre)
- descenso del número de glóbulos blancos.
- Informe a su médico o farmacéutico si alguno de estos efectos adversos se vuelve problemático.

Frecuentes (Puede afectar a ≥ 1/100 y < 1/10 personas)

- indigestión, sentirse hinchado, flatulencia
- sangrado de nariz
- boca seca o úlceras bucales
- infecciones
- adormecimiento anormal
- dificultad para dormir
- dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor en las piernas, inflamación de las piernas/pies. Estos pueden ser signos de coagulación sanguínea en el organismo (tromboembolismo). Si el coágulo se libera, puede viajar hacia los pulmones y puede llegar a ser una amenaza para la salud o incluso provocar la muerte.
- menor eficacia del corazón para bombear la sangre al resto del cuerpo (disfunción cardíaca)
- latidos lentos del corazón
- sangrado por la boca, recto o pulmones
- mareo
- visión borrosa
- sofocos
- hinchazón causada por retención de líquidos en la cara, manos, tobillos, pies o párpados
- hormigueo, debilidad o adormecimiento de las manos, brazos, piernas o pies
- trastornos en la piel, enrojecimiento, picor, piel seca
- trastornos en las uñas
- quemazón, picor, picazón o sensación de hormigueo en la piel
- sensación de frialdad, con escalofríos
- sudoración excesiva
- deshidratación
- dolor de músculos, articulaciones, tendones o dolor en el pecho, espasmos musculares
- ronquera
- dificultad para respirar
- tos
- tos con sangre
- hipo
- pulmones colapsados con el aire atrapado en el espacio que existe entre los pulmones y el pecho, causando a menudo dificultad para respirar (neumotórax).
- baja actividad de la glándula tiroides
- alteración de la función hepática

- aumento de la bilirrubina (sustancia producida por el hígado)
 - aumento de las lipasas (enzima implicada en la digestión)
 - aumento de la creatinina (sustancia producida en los músculos)
 - cambios en los niveles de otras sustancias químicas/enzimas de la sangre.
- Su médico le informará de los resultados de los análisis de sangre. Informe a su médico o farmacéutico si alguno de estos efectos adversos se vuelve problemático.

Poco Frecuentes (Puede afectar a ≥ 1/1000 y < 1/100 personas)

- ictus (interrupción de la circulación de sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o ha quedado tapado, también conocido como accidente cerebro vascular (ACV))
- disminución temporal del suministro de sangre al cerebro (accidente isquémico transitorio)
- interrupción del suministro de sangre a una parte del corazón o ataque al corazón (infarto de miocardio)
- interrupción parcial del suministro de sangre a una parte del corazón (isquemia miocárdica)
- trombos acompañados por un descenso de glóbulos rojos y otras células involucradas en la coagulación sanguínea (microangiopatía trombótica, MAT). Estos pueden causar daños en órganos como el cerebro y los riñones.
- aumento en el número de glóbulos rojos
- dificultad repentina para respirar, especialmente cuando se acompaña de dolor agudo de pecho y/o respiración rápida (embolismo pulmonar)
- sangrado grave en el aparato digestivo (en el estómago, esófago o intestino), o en los riñones, la vagina y el cerebro
- alteraciones del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT)
- agujero (perforación) en el estómago o intestino
- conductos anormales que se forman entre partes del intestino (fístula)
- períodos menstruales pesados o irregulares
- aumentos bruscos de la tensión arterial (crisis hipertensiva)
- inflamación del páncreas (pancreatitis)
- hígado inflamado, que no funciona bien o dañado
- coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos (ictericia)
- inflamación del revestimiento de la cavidad abdominal (peritonitis)
- moqueo
- erupciones que pueden picar o inflamarse (manchas planas o abultadas, o ampollas)
- movimientos intestinales frecuentes
- aumento de la sensibilidad de la piel a la luz del sol

- menor sensibilidad, especialmente en la piel
 - herida cutánea que no cicatriza (úlceras cutáneas)
- Raras (Puede afectar a ≥ 1/10000 y < 1/1000 personas)**
- inflamación del pulmón (neumonitis)
 - aumento y debilitamiento de la pared de un vaso sanguíneo o desgarro de la pared de un vaso sanguíneo (aneurismas y disecciones arteriales)
 - Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)**
 - síndrome de lisis tumoral, resultado de una destrucción rápida de las células cancerosas
 - insuficiencia hepática

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

6. ¿CÓMO DEBO CONSERVAR INIBCO®?

Conservar a temperatura ambiente hasta 30 °C, en lugar seco y en su envase original. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

ADVERTENCIA DE USO

Este producto está envasado en un blíster especial para protegerlo de la humedad. No coloque los comprimidos recubiertos en pastilleros, solo sáquelos del blíster al momento de usarlo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Contenido de lactosa: contiene lactosa.
Contenido de sodio: este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido recubierto, esto es, esencialmente "exento de sodio".

Presentaciones

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Este folleto resume la información más importante de INIBCO®, para mayor información y ante cualquier duda CONSULTE CON SU MÉDICO. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.”

No use este medicamento si la etiqueta o el envase está dañado. Ud. puede tomar INIBCO® hasta el último día del mes indicado en el envase. No tome INIBCO® luego de la fecha de vencimiento.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 59.458

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN

Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F.,
Calle 3 N° 519 Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires
Director Técnico: Pablo Da Pos – Farmacéutico.

Ante cualquier inconveniente con el producto, pacientes, profesionales de la salud y efectores periféricos, pueden llenar el formulario de reporte electrónico (eReporting) en el siguiente enlace: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o bien comunicarse con Laboratorios Richmond al teléfono (11) 5555-1600 o al correo farmacovigilancia@richmondlab.com

Fecha de última revisión: 25/07/2024



402443-03

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

INIBCO®
PAZOPANIB (COMO CLORHIDRATO) 200 y 400 mg
Comprimidos Recubiertos
Vía oral

Venta Bajo Receta Archivada

Industria Argentina

Cada comprimido recubierto de INIBCO® 200 mg contiene:

Pazopanib (como clorhidrato)*	200,0 mg
Sorbitol	62,1 mg
Almidón glicolato de sodio	19,0 mg
Povidona K30	19,0 mg
Estearil fumarato de sodio	3,2 mg
Hipromelosa 2910/5**	3,3 mg
Polietilenglicol 8000**	0,9 mg
Talco**	3,3 mg
Lactosa monohidrato**	1,6 mg
Dióxido de titanio**	0,84 mg
Óxido de hierro rojo**	0,06 mg

*Ecuivalente a 216,7 mg de pazopanib clorhidrato

** Se refiere a los componentes del Opadry II rosa

Cada comprimido recubierto de INIBCO® 400 mg contiene:

Pazopanib (como clorhidrato)*	400,0 mg
Sorbitol	124,2 mg
Almidón glicolato sódico	38,0 mg
Povidona K30	38,0 mg
Estearil fumarato de sodio	6,4 mg
Hipromelosa 2910/5**	6,47 mg
Polietilenglicol 8000**	1,77 mg
Talco**	4,23 mg
Lactosa monohidrato**	3,3 mg
Dióxido de titanio**	4,23 mg

*equivalente a 433,4 mg de pazopanib clorhidrato

** Se refiere a los componentes del Opadry II blanco

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en este prospecto.

1. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE ESTE PRODUCTO?

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar INIBCO®:

- si tiene una enfermedad del corazón
- si tiene una enfermedad del hígado
- si ha tenido fallo cardíaco o un ataque al corazón
- si ha tenido un colapso pulmonar previo
- si ha tenido problemas de sangrado, coagulación sanguínea o estrechamiento de las arterias.
- si ha tenido problemas de estómago o de intestino como perforación (agujero) o fístula (pasajes anormales que se forman entre algunas partes del intestino).
- si ha tenido problemas de tiroides.
- si tiene problemas con la función del riñón.
- Si tiene o ha tenido un aneurisma (aumento y debilitamiento de la pared de un vaso sanguíneo) o un desgarro en la pared de un vaso sanguíneo.
- Consulte con su médico si cree que puede tener cualquiera de estos problemas. Su médico decidirá si INIBCO® es adecuado para usted. Puede que necesite pruebas adicionales para comprobar que sus riñones, corazón y su hígado están funcionando adecuadamente.

Presión arterial elevada e INIBCO®

INIBCO® puede elevar su tensión arterial. Su médico comprobará su presión arterial antes de tomar INIBCO® y mientras lo esté tomando. Si tiene la presión arterial elevada recibirá tratamiento con medicamentos que ayuden a reducirla. Informe a su médico si tiene la presión arterial elevada.

Si va a ser sometido a una operación

Su médico le dirá que deje de tomar INIBCO® al menos 7 días antes de su operación ya que esto puede afectar la cicatrización de las heridas. Su tratamiento se reanudará cuando las heridas hayan cicatrizado adecuadamente.

Afecciones que requieran su atención

INIBCO® puede hacer que otras afecciones empeoren o causen efectos adversos graves. Debe estar atento a ciertos síntomas mientras esté tomando INIBCO®, para reducir el riesgo de cualquier problema.

Niños y adolescentes

INIBCO® no está recomendado en personas menores de 18 años. Todavía no se conoce como funciona en este grupo de edad. Además, no se debe utilizar menores de 2 años de edad debido a problemas de seguridad.

2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTE PRODUCTO?

INIBCO® es un tipo de medicamento denominado inhibidor de la proteína quinasas. Funciona impidiendo la actividad de las proteínas que están implicadas en el crecimiento y la propagación de células cancerígenas. INIBCO® se utiliza en adultos para el tratamiento de:

- Cáncer de riñón avanzado o expandido a otros órganos.
- Algunos tipos de sarcoma de tejidos blandos, que es un tipo de cáncer que afecta al tejido conjuntivo del organismo. Puede aparecer en músculos, vasos sanguíneos, tejido adiposo u otros tejidos que conectan, rodean y protegen los órganos.

3. ¿QUÉ ES LO QUE DEBO SABER ANTES DE TOMAR INIBCO® Y DURANTE EL TRATAMIENTO?

¿Quiénes no deben tomar INIBCO®?

No tome INIBCO®

Si es alérgico a pazopanib o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Consulte con su médico si cree que esto puede sucederle.

¿Qué debo informar a mi médico antes de tomar INIBCO®?

Si usted está embarazada o planea quedar embarazada

INIBCO® no está recomendado si está embarazada. No se conoce el efecto de INIBCO® durante el embarazo. Por lo tanto, informe a su médico si está embarazada o está planeando quedar embarazada. Utilice un método anticonceptivo fiable para evitar quedar embarazada mientras toma INIBCO® y durante las dos semanas siguientes a la suspensión del tratamiento con INIBCO®. Si queda embarazada durante el tratamiento con INIBCO® informe a su médico sobre los riesgos y beneficios de tomar INIBCO® para usted y su bebé. Su médico puede recomendarle que no tome INIBCO® mientras está embarazada.

Si usted está amamantando

No dé el pecho mientras está en tratamiento con INIBCO®. No se conoce si los componentes de INIBCO® pasan a la leche materna. Informe a su médico de esto.

Fertilidad

Los pacientes varones (incluidos los que han tenido una vasectomía) con pareja sexual que está embarazada, con sospecha de embarazo o en edad fértil (incluyendo a las que utilizan otros métodos anticonceptivos), deben usar preservativo durante las relaciones sexuales mientras estén usando pazopanib y durante al menos 2 semanas después de la última dosis del fármaco.

La fertilidad se puede ver afectada por el tratamiento con INIBCO®. Consulte con su médico sobre esto.

¿Puedo tomar INIBCO® con otros medicamentos?

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma. Ello incluye medicamentos bajo receta, medicamentos de venta libre y suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de INIBCO® o aumentar la probabilidad de que sufra efectos adversos. INIBCO® también puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos. Entre estos se incluyen:

- claritromicina, ketoconazol, itraconazol, rifampicina, telitromicina, voriconazol (utilizados para tratar infecciones).

- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (utilizados para tratar el VIH).

- nefazodona (utilizado para tratar la depresión).

- simvastatina y posiblemente otras estatinas (utilizadas para el tratamiento de los niveles altos de colesterol).

- medicamentos que reducen la acidez del estómago. El tipo de medicamento que esté tomando para reducir la acidez de estómago (por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones, antagonistas de los receptores H2 o antiácidos) puede afectar a cómo ha de tomar INIBCO®.

Consulte con su médico o con su enfermero para obtener más información.

Informe a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos.

Conducción y uso de máquinas

INIBCO® puede producir efectos adversos que pueden afectar su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Por lo tanto, evite conducir o utilizar máquinas si se siente mareado, cansado o débil, o si está bajo de energía.

4. ¿CÓMO DEBO TOMAR INIBCO®?

La vía de administración de este producto es oral.

Siga exactamente las instrucciones de administración de INIBCO® indicadas por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas.

La dosis normal es de 800 mg de pazopanib tomados una vez al día. Esta es la dosis máxima por día. La dosis se puede tomar como 2 comprimidos de 400 mg o como 4 comprimidos de 200 mg. Puede que su médico necesite reducirle la dosis si sufre efectos adversos.

Trague los comprimidos enteros con agua, uno tras otro, aproximadamente a la misma hora cada día.

No rompa ni triture los comprimidos, ya que afectaría la absorción del medicamento y puede aumentar la probabilidad de que se produzcan efectos adversos.

Es importante que tome INIBCO® **al menos una hora antes o dos horas después de una comida.**

En función de su respuesta al tratamiento, su médico puede recomendar ajustarle la dosis del tratamiento o interrumpir su administración temporalmente.

Toma de INIBCO® con alimentos y bebidas

No tome INIBCO® con alimentos, ya que estos afectan a la absorción del medicamento. Tómelo al menos dos horas después de la comida o una hora antes de la comida.

No beba jugo de pomelo mientras esté en tratamiento con INIBCO®, ya que esto puede aumentar la probabilidad de aparición de efectos adversos.

¿Qué debo hacer si dejo de tomar una dosis?

Si olvida tomar INIBCO®

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente dosis cuando corresponda.

¿Qué debo hacer en caso de sobredosis?

Si toma más INIBCO® del que debe

Si toma más INIBCO® del que debe, consulte a su médico o farmacéutico para que le asesore. Si es posible, muéstreles el envase de INIBCO®.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648, (011) 4658-7777

No interrumpa el tratamiento con INIBCO® sin consultarlo con su médico.

Tome INIBCO® durante el tiempo que le haya recomendado su médico.

5. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDE TENER INIBCO®?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Posibles efectos adversos graves

Inflamación del cerebro (síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible): en raras ocasiones, pazopanib puede provocar inflamación del cerebro, que puede poner en riesgo su vida. Entre los síntomas se incluyen:

- pérdida del habla
- cambios en la vista
- convulsiones (ataques epilépticos)
- confusión
- tensión arterial elevada

Deje de tomar pazopanib y busque atención médica inmediatamente si presenta cualquiera de estos síntomas o si tiene dolor de cabeza acompañado de alguno de estos síntomas.

Crisis hipertensivas (aumento en la tensión arterial repentina y grave): pazopanib puede causar en algunas ocasiones un aumento repentino y grave en la tensión arterial. Esto se conoce como crisis hipertensiva. Su médico controlará su tensión arterial mientras esté tomando pazopanib. Los signos y síntomas de una crisis hipertensiva pueden incluir:

- dolor en el pecho grave
- dolor de cabeza grave
- visión borrosa
- confusión
- náuseas
- vómito

- ansiedad grave
- dificultad para respirar
- convulsiones
- desvanecimiento

Deje de tomar pazopanib y busque atención médica inmediatamente si presenta una crisis hipertensiva.

Enfermedades de corazón: el riesgo de presentar estos problemas puede ser mayor en personas que presentan un problema de corazón o que están tomando otros medicamentos. Mientras está tomando pazopanib le controlarán si presenta cualquier problema en el corazón.

- **Alteración cardíaca/insuficiencia cardíaca, paro cardíaco:** pazopanib puede afectar el modo de bombear el corazón o puede aumentar la probabilidad de sufrir un paro cardíaco. Los signos y síntomas incluyen:

- latido irregular o rápido
- palpitaciones rápidas del corazón
- desvanecimiento
- dolor o presión en el pecho
- dolor en los brazos, espalda, cuello o mandíbulas
- dificultad para respirar
- inflamación en las piernas

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

- **Cambios en el ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT):** pazopanib puede afectar al ritmo cardíaco que en algunas personas puede desencadenar una enfermedad del corazón potencialmente grave, conocida como torsade de pointes. Esto puede provocar una aceleración del ritmo cardíaco que puede dar lugar a una pérdida del conocimiento. Informe a su médico si nota cualquier cambio inusual en el latido del corazón, como latidos demasiado rápidos o demasiado lentos.

Accidente cerebrovascular: pazopanib puede aumentar la posibilidad de presentar un accidente cerebrovascular. Los signos y síntomas de accidente cerebrovascular pueden incluir:

- entumecimiento o debilidad de un lado del cuerpo
- dificultad para hablar
- dolor de cabeza
- mareo

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Sangrado: pazopanib puede causar hemorragias graves en el aparato digestivo (en el estómago, esófago, recto o intestino), o en los pulmones, riñones, boca, vagina y cerebro, aunque esto es poco frecuente. Entre los síntomas se incluyen:

- sangre en las heces o heces negras
- sangre en la orina
- dolor de estómago
- tos o vómitos de sangre

Busque atención médica inmediatamente si sufre alguno de estos síntomas.

Perforación y fistula: pazopanib puede causar una perforación en el estómago o la pared del intestino o la aparición de una conexión anormal entre dos partes del tubo digestivo (una fistula). Los signos y síntomas pueden incluir:

- dolor de estómago grave

- náuseas y/o vómitos

- fiebre

- desarrollo de una perforación en el estómago o intestino de la cual se libera pus sanguinolento o con mal olor

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Problemas del hígado: pazopanib puede causar problemas con el hígado que pueden convertirse en enfermedades graves como insuficiencia hepática o fallo hepático, que pueden ser mortales. Su médico controlará los enzimas del hígado mientras está tomando pazopanib. Los signos que su hígado puede no estar funcionando correctamente pueden incluir:

- color amarillento de la piel o la parte blanca de los ojos (ictericia)
- orina de color oscuro
- cansancio
- náusea
- vómitos

- pérdida de apetito
- dolor en la parte derecha de la zona del estómago (abdomen)
- facilidad en la aparición de moretones

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Coágulos en la sangre

- **Trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar:** pazopanib puede causar coágulos en las venas, especialmente en las piernas (trombosis venosa profunda o TVP), que pueden desplazarse a los pulmones (embolismo pulmonar). Los signos y síntomas pueden incluir:

- dolor agudo en el pecho
- dificultad para respirar
- respiración rápida
- dolor en las piernas
- inflamación de los brazos y manos o piernas y pies

- **Microangiopatía trombótica (MAT):** pazopanib puede causar coágulos en la sangre en los vasos sanguíneos pequeños de los riñones y el cerebro, acompañados por una reducción de glóbulos rojos y de células implicadas en la coagulación (microangiopatía trombótica, MAT). Los signos y síntomas pueden incluir:

- facilidad de aparición de moretones
- tensión arterial elevada
- fiebre

- confusión
- somnolencia
- convulsiones

- disminución en la cantidad de orina

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Síndrome de lisis tumoral: pazopanib puede causar una destrucción rápida de las células cancerosas provocando un síndrome de lisis tumoral, que en algunas personas puede ser mortal. Los síntomas pueden incluir latido irregular, convulsiones, confusión, calambres o espasmos musculares, o disminución de la eliminación de orina. Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Infecciones: las infecciones que aparecen mientras está tomando pazopanib pueden convertirse en graves. Los síntomas de infecciones pueden incluir:

- fiebre
- síntomas similares a la gripe, como tos, cansancio y dolor en el cuerpo que no desaparece
- dificultad para respirar y/o sibilancias
- dolor al orinar
- cortes, rasguños o heridas que son de color rojo, calientes, inflamados o dolorosos

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Inflamación de pulmón: pazopanib puede causar, en raras ocasiones, inflamación del pulmón (enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis), que en algunas personas puede llegar a ser mortal. Los síntomas incluyen dificultad al respirar o tos que no desaparecen. Le controlarán cualquier problema de pulmón mientras esté tomando pazopanib.

Busque atención médica inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas.

Problemas de tiroides: pazopanib puede disminuir la cantidad de hormona tiroidea producida en su cuerpo. Esto puede ocasionar aumento de peso y cansancio. Se le controlará los niveles de hormona tiroidea mientras esté tomando pazopanib.

Informe a su médico si nota aumento de peso significativo o cansancio.

Visión borrosa o alteración de la visión: pazopanib puede causar la separación o el desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina o desgarro). Esto puede provocar visión borrosa o alteraciones en la visión.

Informe a su médico si nota cualquier cambio en la visión.

Posibles efectos adversos (incluyendo posibles efectos adversos graves bajo la categoría de frecuencia relevante).

Muy Frecuentes (Puede afectar a ≥ 1 de cada 10 personas)

- tensión arterial elevada
- diarrea
- sentirse o estar mareado (náuseas o vómitos)
- dolor de estómago
- pérdida de apetito
- pérdida de peso
- alteraciones del gusto o pérdida del gusto
- irritación en la boca
- dolor de cabeza
- dolor tumoral
- falta de energía, sensación de debilidad o cansancio