

TALPRAM®
ESCITALOPRAM (como oxalato) 10 mg - 20 mg
Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta Archivada

Industria Argentina

Cada comprimido recubierto de 10 mg contiene:

Escitalopram (como oxalato).....	10,0 mg
Celulosa microcristalina.....	92,74 mg
Croscarmelosa sódica.....	3,6 mg
Dióxido de silicio coloidal.....	0,55 mg
Estearato de Magnesio.....	2,64 mg
Talco.....	9,462 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa.....	1,613 mg
Dióxido de Titanio.....	0,361 mg
Polietilenglicol 8000.....	0,44 mg
Laca rojo punzó.....	0,009 mg
Lactosa monohidrato micronizada.....	0,815 mg

Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene:

Escitalopram (como oxalato).....	20,0 mg
Celulosa microcristalina.....	185,48 mg
Croscarmelosa sódica.....	7,2 mg
Dióxido de silicio coloidal.....	1,1 mg
Estearato de Magnesio.....	5,28 mg
Talco.....	18,924 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa.....	3,226 mg
Dióxido de Titanio.....	0,704 mg
Polietilenglicol 8000.....	0,88 mg
Laca rojo punzó.....	0,036 mg
Lactosa monohidrato micronizada.....	1,63 mg

Sírvase leer esta información antes de comenzar a incluir Talpram®, aun cuando simplemente haya repetido la receta (o antes de empezar a usarlo y cada vez que renueve su receta). Puede haber información nueva (o alguna información puede haber cambiado). Recuerde que su médico le recetó este medicamento sólo a usted. No lo administre o recomiende a ninguna otra persona. Esta información no reemplaza el diálogo con su médico acerca de su enfermedad o el tratamiento. Talpram® debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica archivada.

1. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE TALPRAM®?

Talpram® y otros medicamentos antidepresivos pueden causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Mayor riesgo de pensamientos o acciones suicidas: Talpram® y otros medicamentos antidepresivos pueden aumentar los pensamientos o acciones suicidas en algunos niños, adolescentes o adultos jóvenes dentro de los primeros meses de tratamiento o cuando se modifica la dosis.

- La depresión u otras enfermedades mentales graves son las causas más importantes de pensamientos o acciones suicidas. **¿Cómo puedo estar atento e intentar prevenir los pensamientos y acciones suicidas?**

- Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos, o si desarrolla pensamientos o acciones suicidas. Esto es muy importante cuando se comienza a tomar un medicamento antidepresivo o cuando se cambia la dosis.

- Llame a su médico de inmediato para informar sobre cambios nuevos o repentinos en el estado de ánimo, el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos, o si usted desarrolla pensamientos o acciones suicidas.

- Acuda a todas las visitas de seguimiento con su médico según lo programado y llámelo entre visitas si le preocupan los síntomas.

- Llame a su médico de inmediato si usted tiene alguno de los siguientes síntomas, o llame al 911 en caso de emergencia, especialmente si son nuevos, peores o le preocupan:

- Intentos de suicidio
- Comportamiento impulsivo y peligroso
- Comportamiento agresivo o violento
- Pensamientos sobre suicidio o muerte
- Depresión nueva o agravada
- Ansiedad o ataques de pánico nuevo o agravado
- Se siente agitado, inquieto, enojado o irritable
- Problemas para dormir
- Aumento en la actividad o hablar más de lo normal para usted
- Otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado

de ánimo.

2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA TALPRAM®?

Talpram® es un medicamento recetado que se usa para tratar:

- Un tipo de depresión denominado Trastorno Depresivo Mayor (TDM) en adultos y en niños de 12 años de edad y mayores;
- El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en adultos y en niños de 7 años de edad y mayores.

No se ha establecido si Talpram® es seguro y eficaz para su uso en niños menores de 12 años con Trastorno Depresivo Mayor, ni en niños menores de 7 años con Trastorno de Ansiedad Generalizada.

3. ¿QUÉ ES LO QUE DEBO SABER ANTES DE TOMAR TALPRAM® Y DURANTE EL TRATAMIENTO?

¿Quiénes no deben usar Talpram®?

No tome Talpram® si:

- Es alérgico a escitalopram o citalopram, o cualquier ingrediente que contiene Talpram®.

- Está tomando o ha dejado de tomar en los últimos 14 días un medicamento llamado inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO). Pregúntele a su médico si no está seguro si toma un IMAO, incluido linezolid o azul de metileno intravenoso.
- Está tomando el medicamento antipsicótico pimozida.

Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro o tiene dudas sobre la medicación que toma. No empiece a tomar un IMAO hasta al menos 14 días después de que usted haya dejado de tomar Talpram®.

¿Qué debo informar a mi médico antes de iniciar el tratamiento con Talpram®?

Antes de iniciar el tratamiento con Talpram®, avise a su médico si usted:

- Tiene problemas hepáticos
- Tiene problemas renales
- Tiene problemas cardíacos
- Tiene o ha tenido ataques o convulsiones
- Tiene trastorno bipolar, manía o hipomanía, o si hay antecedentes en su familia.
- Tiene bajos niveles de sodio en sangre
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado
- Tiene antecedentes de ataque cerebrovascular
- Tiene presión alta en los ojos (glaucoma)
- Tiene o ha tenido problemas circulatorios
- Está embarazada o planea estarlo. Se desconoce si Talpram® puede dañar a su bebé no nacido. Tomar Talpram® durante el tercer trimestre del embarazo puede provocar que el bebé tenga síntomas de abstinencia o problemas respiratorios, de control de la temperatura, de alimentación u otros problemas después del nacimiento. Consulte a su médico sobre los riesgos y beneficios del tratamiento de la depresión durante el embarazo.
- Está amamantando o planea amamantar. Algo de Talpram® puede pasar a la leche materna y dañar al bebé. Consulte con su médico sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma Talpram®.

¿Puedo usar Talpram® con otros medicamentos?

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría utilizar cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos recetados y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Esto se debe a que Talpram® y algunos medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios graves. Talpram® puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa Talpram®.

Informe a su médico si usted está tomando ciertos medicamentos tales como:

- Triptanos, usados para tratar migrañas
- Medicamentos usados para tratar el estado de ánimo, la ansiedad, trastornos psicóticos o mentales, incluyendo antidepresivos tricíclicos, litio, inhibidores selectivos de la recaptación neuronal de serotonina (ISRS), inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSNA); anfetaminas o antipsicóticos.
- Diuréticos
- Buspirona
- Tramadol, fentanilo, meperidina, metadona u otros opioides
- Suplementos de venta libre tales como triptófano o Hierba de San Juan
- Medicamentos que pueden afectar la coagulación de la sangre, como la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y la warfarina.

Si usted toma Talpram®, no debe tomar ningún otro medicamento que contenga:

- Escitalopram o Citalopram
- Pimozida

Su médico puede indicarle si es seguro o no tomar Talpram® con otros medicamentos.

No comience ni interrumpa ningún medicamento mientras esté tomando Talpram® sin consultar antes con su médico.

4. ¿CÓMO DEBO TOMAR TALPRAM®?

La vía de administración de Talpram® es oral (por boca). Use Talpram® exactamente como se lo indicó el médico, a las horas del día que correspondan respetando la dosis y duración. Siga todas las instrucciones de su receta. No use este medicamento en mayor o menor cantidad o por más tiempo de lo recomendado por su médico. Su médico puede necesitar cambiar la dosis de Talpram® hasta encontrar la que sea adecuada para usted. Talpram® puede tomarse con o sin comida. No continúe Talpram® sin antes hablar con su médico. Interrumpir Talpram® de manera abrupta puede causar síntomas graves.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE SOBREDOSIFICACIÓN?

Si toma demasiado Talpram®, llame a su médico o al centro de intoxicación más cercano, o busque tratamiento de emergencia.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿Qué debo hacer si dejo de usar una dosis?

Si se olvida de una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Si es cercano al momento de la siguiente dosis, saltee la dosis olvidada y tome la siguiente en el horario habitual.

¿Qué debo evitar mientras tomo Talpram®?

- Talpram® puede causar insomnio o puede afectar su capacidad para tomar decisiones, pensar claramente, o reaccionar rápidamente. No debe manejar, operar maquinaria pesada, o realizar actividades peligrosas hasta no conocer como le afecta Talpram®.
- No tome alcohol mientras esté en tratamiento con Talpram®.

5. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDE TENER TALPRAM®?

Talpram® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Síndrome serotoninérgico

Cuando se toma Talpram® junto con otros medicamentos, puede producirse un problema potencialmente mortal denominado síndrome serotoninérgico. Informe a su médico o acuda inmediatamente a la sala de urgencias del hospital más cercano si usted presenta alguno de los siguientes signos y síntomas del síndrome serotoninérgico:

- Agitación
- Confusión
- Latidos cardíacos rápidos
- Sudoración
- Rubor
- Confusión
- Tiene alucinaciones (ver y oír cosas que no son reales)
- Coma
- Cambios en la presión arterial
- Temblores, rigidez muscular o espasmos musculares
- Mareos
- Temperatura corporal elevada (hipertermia)
- Pérdida de coordinación

Síndrome de abstinencia

La interrupción repentina de Talpram® puede provocar efectos secundarios graves. Es posible que su médico desee reducir la dosis gradualmente. Los síntomas pueden incluir:

- Cambios en el estado de ánimo o dolor de cabeza
- Irritabilidad y agitación o cansancio
- Mareos o problemas para dormir
- Sensación de descarga eléctrica (parestesia) o hipomanía
- Ansiedad o zumbido en los oídos (tinnitus)

Convulsiones

Episodios maniacos

Los episodios maniacos pueden ocurrir en personas con trastorno bipolar que toman Talpram®. Los síntomas pueden incluir:

- Aumento considerable de la energía
- Graves problemas para dormir
- Pensamientos acelerados
- Comportamiento imprudente
- Ideas inusualmente grandiosas
- Felicidad o irritabilidad excesivas
- Hablar más o más rápido de lo habitual

Niveles bajos de sodio en la sangre (hiponatremia)

Durante el tratamiento con Talpram® pueden producirse niveles bajos de sodio en la sangre que pueden ser graves y provocar la muerte. Las personas mayores y las personas que toman determinados medicamentos pueden tener un mayor riesgo de desarrollar niveles bajos de sodio en la sangre. Los signos y síntomas pueden incluir:

- Dolor de cabeza
- Problemas para concentrarse o pensar
- Debilidad o sensación de inestabilidad que puede provocar caídas
- Confusión
- Problemas de memoria

En casos más graves o repentinos, los signos y síntomas incluyen:

- Ver u oír cosas que no son reales (alucinaciones)
- Convulsiones
- Desmayos
- Coma
- Interrupción de la respiración (paro respiratorio)

Aumento del riesgo de hemorragia

Tomar Talpram® con aspirina, AINE, warfarina u otros anticoagulantes puede aumentar este riesgo. Informe a médico si presenta hemorragias o hematomas inusuales.

Problemas visuales (glaucoma de ángulo cerrado)

Talpram® puede causar un tipo de problema ocular llamado glaucoma de ángulo cerrado en personas con ciertos problemas oculares. Es posible que deba someterse a un examen ocular para ver si están en riesgo y recibir tratamiento preventivo si es el caso. Informe a su médico si usted tiene:

- Dolor ocular
- Cambios en la visión
- Hinchazón o enrojecimiento en o alrededor del ojo

Problemas sexuales (disfunción)

Tomar Talpram® puede causar problemas sexuales. Los síntomas en los hombres pueden incluir:

- Retraso en la eyaculación o incapacidad para eyacular
- Problemas para conseguir o mantener una erección

Los síntomas en las mujeres pueden incluir:

- Disminución del deseo sexual
- Retraso en el orgasmo o incapacidad para tener un orgasmo

Consulte a su médico si nota algún cambio en su función sexual o si tiene alguna pregunta o inquietud sobre problemas sexuales durante el tratamiento con Talpram®. Es posible que su médico pueda sugerirle algunos tratamientos.

Los efectos secundarios más comunes de Talpram® incluyen:

- Cambios en el deseo, rendimiento y satisfacción sexual
- Cansancio
- Náusea

- Somnolencia
- Problemas para dormir
- Sudoración

Durante el tratamiento con Talpram® pueden producirse cambios en la estatura y el peso de los niños. Se debe controlar la estatura y el peso de su hijo durante el tratamiento con Talpram®.

Consulte con su médico si hay algún efecto adverso que lo aqueje o que no se vaya. Estos no son todos los posibles efectos adversos de Talpram®. Para más información, consulte a su médico.

Reporte de efectos adversos

Si tiene efectos secundarios, tome contacto con su médico de inmediato. Esto incluye los posibles efectos secundarios que no figuran en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente comunicándose con Laboratorios Richmond, o ANMAT (datos de contacto ubicados al final del prospecto). Al informar sobre los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TALPRAM®

Los medicamentos a veces son prescritos para otros propósitos que los listados en esta guía. No use Talpram® para un propósito para el cual no fue prescrito. No le dé Talpram® a otras personas, incluso si tienen la misma afección que usted. Puede dañarlos.

ADVERTENCIA DE USO

Este producto está envasado en un blíster especial para protegerlo de la humedad. No coloque los comprimidos recubiertos en pastilleros, sólo sáquelos del blíster al momento de usarlo.

6. ¿CÓMO DEBO CONSERVAR TALPRAM®?

Consérvese a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Talpram® 10 mg: envases de 10, 15, 30, 250, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, siendo los tres últimos de uso hospitalario exclusivo.

Talpram® 20 mg: envases de 10, 15, 30, 250, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, siendo los tres últimos de uso hospitalario exclusivo.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Este medicamento ha sido prescrito sólo para su problema médico actual. No se lo recomienda a otras personas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

Este medicamento es libre de gluten

Ante cualquier inconveniente con el producto, pacientes, profesionales de la salud y efectores periféricos, pueden llenar el formulario de reporte electrónico (eReporting) en el siguiente enlace:

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos>
o bien comunicarse con Laboratorios Richmond al teléfono (11) 5555-1600 o al correo farmacovigilancia@richmondlab.com

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Certificado N° 54.920

Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F.,
Calle 3 N°519 Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires
Director Técnico: Pablo Da Pos – Farmacéutico.

Fecha de revisión última: 17/02/2026

